

PROSPAN®

Liquid



HEDERAE FOLII EXTRACTUM SICCCUM (5-7,5:1)

SASTAV

Što sadržava Prospan® Liquid?

Djelatna tvar: 5 ml oralne otopine (jedna vrećica) sadržava 35 mg suhog ekstrakta lista bršljana (5-7, 5:1), ekstrakcijsko otapalo: 30 % etanol (w/w).

Pomoćne tvari: kalijev sorbat, limunska kiselina, bezvodna, ksantanska guma, sorbitol 70 %, kristalizirajući, aroma naranče, aroma Frescofort Permaseal, mentol, pročišćena voda.

5 ml oralne otopine (jedna vrećica) sadrži 1,926 g zamjenskog sladila sorbitola = 0,16 BU

Prospan® Liquid ne sadržava alkohol, šećer, boje ili gluten.

FARMACEUTSKI OBLIK I PAKIRANJE

Oralna otopina. Kutija sa 30 vrećica; svaka sadrži 5 ml oralne otopine.

FARMAKOTERAPIJSKA GRUPA

Prilpravci s učinkom na respiratorni sustav - Prilpravci za liječenje kašlja i prehlade - Ekspektoransi

NOSITELJ ODOBRENJA

Salveo d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, Hrvatska

PROIZVOĐAČ

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA

Bez recepta, izdaje se u ljekarnama i u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

TERAPIJSKE INDIKACIJE

Kada primijeniti Prospan® Liquid?

Za ublažavanje tegoba kroničnih upalnih bolesti bronha, kod akutne upale respiratornog sustava praćene kašljem.

Kako djeluje Prospan® Liquid?

Prospan razrjeđuje gustu sluz i pospješuje iskašljavanje.

Istodobno smanjuje podražaj na kašalj. Na taj način suzbija tipične simptome bronhitisa: pojačanu sekreciju guste sluzi, otežano disanje i podražaj na kašalj, te omogućava bolesniku da ponovno normalno diše.

KONTRAINDIKACIJE

Kada se ne smije primijeniti Prospan® Liquid?

Kontraindiciran je kod pacijenata s poznatom preosjetljivošću na djelatnu tvar ili na bilo koji drugi sastojak Prospan® Liquida. Zbog nedostatka kliničkih podataka, Prospan® Liquid ne smiju uzimati djeca mlađa od 12 godina.

Sadrži sorbitol. Kad sa koristi prema uputi, svaka doza sadrži 1,9 g sorbitola.

U slučaju nepodnošljivosti fruktoze, pripravak koristiti nakon savjetovanja s liječnikom.

MJERE OPREZA

Na što valja pripaziti pri primjeni Prospan® Liquida?

Treba se točno pridržavati upute o lijeku.

INTERAKCIJE S DRUGIM LIJEKOVIMA I DRUGI OBLICI INTERAKCIJA

Do sada nisu ispitivane i nisu poznate interakcije s drugim lijekovima, kao niti s hranom ili pićem. Obavijestite liječnika ili ljekarnika u slučaju da uzimate ili ste u posljednje vrijeme uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući lijekove bez recepta.

POSEBNA UPOZORENJA

Nema.

Trudnoća i dojenje: Prospan® Liquid ne smije se uzimati u trudnoći i tijekom dojenja zbog nedovoljnog broja kliničkih ispitivanja na trudnicama i dojiljama.

Upravljanje vozilima i strojevima: Nisu potrebne posebne mjere opreza.

DOZIRANJE I NAČIN UPORABE

Kako uzimati Prospan® Liquid?

Ukoliko liječnik nije drukčije propisao, odrasli uzimaju jednu vrećicu od 5 ml Prospan® Liquida tri puta dnevno (odgovara

PROSPAN®


Liquid




HEDERAE FOLII EXTRACTUM SICCCUM (5-7,5:1)

105 mg suhog ekstrakta lišća bršljana na dan). Oralnu otopinu je potrebno uzeti nerazrijeđenu ujutro, sredinom dana i navečer. U slučaju da zaboravite uzeti Prospan® Liquid nemojte uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu. Jednostavno nastavite uzimati lijek kako vam je propisao liječnik ili prema uputi o lijeku.


Za Prospan® Liquid izabrane su vrećice koje se jednostavno otvaraju. Detalje o primjeni vidjeti na sljedećim slikama:



Nježno istegnuti vrećicu prije uporabe, kao što je prikazano.



Čvrsto primiti vrećicu i otvoriti.



Piti otopinu, istodobno stižući vrećicu dok se ne isprazni.

Koliko dugo se smije upotrebljavati Prospan® Liquid?

Trajanje liječenja ovisi o vrsti i težini simptoma. Kod blažih upala koristi se najmanje tjedan dana. Kako bi se osigurala bolja djelotvornost, Prospan® Liquid treba uzimati još najmanje dva do tri dana nakon prestanka simptoma bolesti.

Napomena:

U slučaju produljenih tegoba, teškog disanja, povišene temperature, gnojnog ili krvavog iskašljaja, odmah potražiti savjet liječnika.

Obavijestite liječnika ili ljekarnika imate li dojam da Prospan® Liquid djeluje preslabo ili prejako.

PREDOZIRANJE

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Primjena značajno većih količina (više od trostruke dnevne doze) može izazvati mučninu, povraćanje ili proljev. U tom slučaju treba se savjetovati s liječnikom.

NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, Prospan® Liquid može izazvati nuspojave. Vezano za učestalost nuspojave, koriste se sljedeći pojmovi:

Vrlo često:

više od jedan na deset liječenih bolesnika

Često:

manje od jedan na 10, ali više od jedan na 100 liječenih bolesnika

Manje često:

manje od 1 na 100, ali više od jedan na 1000 liječenih bolesnika

Rijetko:

manje od 1 na 1000, ali više od jedan na 10.000 liječenih bolesnika

Vrlo rijetko:

manje od 1 na 10.000 liječenih bolesnika, uključujući izolirane slučajeve

Vrlo rijetko: alergijske reakcije (teško disanje, oticanje, crvenilo kože, svrbež) mogu se javiti u slučaju uzimanja lijekova koji sadrže bršljan.

Manje često: u osjetljivih pacijenata mogu se pojaviti probavne smetnje (mučnina, povraćanje, proljev).
O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

ROK VALJANOSTI

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakovanju.

NAČIN ČUVANJA LIJEKA

Lijek valja čuvati izvan dohvata i vidokruga djece!

DATUM REVIZIJE UPUTE

Studeni, 2007.

BROJ I DATUM RJEŠENJA

UP/1-530-09/07-01/61 od 29.02.2008.



ENGELHARD
ARZNEIMITTEL