

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, Tyrosur® gel može imati nuspojave.

Učestalost i klasifikacija nuspojava temelje se na sljedećim vrijednostima:

Vrlo često: > 1/10 (>10%)
Često: > 1/100 i < 1/10 (>1% i <10%)
Manje često: > 1/1000 i < 1/100 (>0,1% i <1%)
Rijetko: > 1/10000 i < 1/1000 (>0,01% i <0,1%)
Vrlo rijetko: > 1/10000 (<0,01%)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

- **Vrlo rijetko:** reakcije osjetljivosti, poput peckanja kože.

Ako nastupe reakcije preosjetljivosti, ne trebate dalje koristiti Tyrosur® gel. U tom slučaju obratite se svom liječniku.

O svakoj nuspojavi obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI TYROSUR® GEL?

Čuvati pri temperaturi do 25°C.

🔑 **Čuvati izvan dohвата i vidokruga djece!**

Ne koristiti lijek nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakiranju.

Nakon prvog otvaranja Tyrosur® gel se može koristiti tri mjeseca.

Datum revizije upute

Listopad, 2008.

Broj i datum Rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj:

UP/1-530-09/07-01/268
od 18. studenog 2008.



Uputa o lijeku

Pazljivo pročitajte uputu prije nego što počnete uzimati Tyrosur® gel jer sadrži za vas važne obavijesti. Da bi Tyrosur® gel bio potpuno djelotvoran, trebate ga pravilno koristiti.

- Sačuvajte uputu, možda ćete je trebati ponovno čitati.
- Za bilo kakva pitanja ili dodatne obavijesti obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ako se simptomi pogoršavaju ili ne prolaze, morate se obratiti liječniku.

Uputa sadrži sljedeće obavijesti:

- 1. Što je Tyrosur® gel i za što se koristi?**
- 2. Što trebate znati prije korištenja Tyrosur® gela?**
- 3. Kako koristiti Tyrosur® gel?**
- 4. Koje su moguće nuspojave?**
- 5. Kako čuvati Tyrosur® gel?**

Tyrosur® gel

Tyrothricinum

Djelatna tvar je tirotricin.

100 g gela sadržava 0,1 g tirotricina.

Ostali sastojci su: cetilpiridinijev klorid, propilenglikol, etanol (96 postotni), karbomeri, trometamol, pročišćena voda.

Tyrosur® gel dostupan je u pakiranju od 5 g u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

1. ŠTO JE TYROSUR® GEL I ZA ŠTO SE KORISTI?

- Tyrosur® gel je lokalni antibiotik.
- Tyrosur® gel koristi se za liječenje manjih, površinskih, umjereno vlažnih rana.

Naziv i adresa nositelja odobrenja

SALVEO d.o.o.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb
Hrvatska

Naziv i adresa proizvođača

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG.
Herzbergstr. 3 61138
Niederdorfelden
Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni.

2. ŠTO TREBATE ZNATI PRIJE UZIMANJA TYROSUR® GELA?

Tyrosur® gel ne treba uzimati

- ako ste preosjetljivi (alergični) na tirotricin ili na bilo koji sastojak Tyrosur® gela.

Tyrosur® gel ne treba nanositi na sluznicu nosa.

U kojim se slučajevima preporučuje poseban oprez pri korištenju Tyrosur® gela?

Poseban oprez potreban je pri nanošenju u blizini očiju. Gel ne smije doći u dodir s očima jer može izazvati osjećaj peckanja.

Trudnoća

Nema podataka o sigurnosti korištenja Tyrosur® gela tijekom trudnoće. Na

osnovi ograničenih studija na životinjama nije zaključeno postoji li potencijalni rizik za ljude. Stoga, Tyrosur® gel ne bi trebalo koristiti tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se cetilpiridinijev klorid ili tirotricin u majčino mlijeko. Stoga, Tyrosur® gel ne bi trebalo koristiti tijekom dojenja.

Sposobnost upravljanja vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Važna upozorenja o ostalim sastojcima Tyrosur® gela

Tyrosur® gel sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože.

Interakcije s drugim lijekovima

Nisu poznati lijekovi koji utječu na djelotvornost Tyrosur® gela. Tyrosur® gel ne utječe na djelotvornost drugih lijekova.

Obavijestite svojeg liječnika uzimate li ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

3. KAKO KORISTITI TYROSUR® GEL?

Uvijek uzimajte Tyrosur® gel točno kako je opisano u ovoj uputi ili kako vas je uputio vaš liječnik ili ljekarnik. Ako ste u nedoumici, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Način primjene

Nanošenje na kožu.

Ako vaš liječnik nije drukčije propisao, uobičajena je sljedeća doza:

Tyrosur® gel nanosi se dva ili tri puta dnevno u dovoljnoj količini da potpuno prekrije ozlijeđene dijelove kože.

Kako i kad treba koristiti Tyrosur® gel?

Gel se nanosi ujutro (ili sredinom dana) i navečer u dovoljnoj količini kako bi se pokrila područja kože koja se žele liječiti. Kod malih rana ili upala kože nije potreban zavoj. U slučaju većih ili jako vlažnih rana preporučuje se zavoj koji treba mijenjati svakih jedan - dva dana ili prema savjetu liječnika.

Koliko dugo treba koristiti Tyrosur® gel?

Trajanje liječenja ovisi o ozbiljnosti i tijeku kliničkog stanja. Ako se simptomi pogoršaju ili ako nema

promjene tijekom tjedan dana, morate se obratiti svom liječniku.

Ako mislite da je učinak Tyrosur® gela previše jak ili previše slab, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Što ako ste nanijeli previše Tyrosur® gela?

Ne očekuju se nikakve posljedice. Nastavite liječenje kao što je gore opisano. Ako su, unatoč tome, prisutni neobični simptomi, obratite se svom liječniku.

Što ako ste zaboravili koristiti Tyrosur® gel?

Nastavite s liječenjem kao što je gore opisano.

Što ako prestanete koristiti Tyrosur® gel?

Trajanje liječenja ovisi o ozbiljnosti i tijeku kliničkog stanja. Ako ste prekinuli liječenje Tyrosur® gelom, nećete postići željeni učinak.